

Centres d'imagerie Médicale

Siège social :
Site Médipole
66330 CABESTANY

Centres de radiologie

- 61 av Leclerc - Perpignan 04 68 51 22 98
- 9 bis av Gl Guillaud - Thuir 04 68 53 16 18
- rue E. Pares - Rivesaltes 04 68 64 65 05
- Médipole - Cabestany 04 68 66 10 90

Imagerie en coupes :

- IRM - Médipole 04 68 50 15 15
- SCANNER - Médipole 04 68 50 14 14
- SCANNER - Clinique Mutualiste Catalane 04 68 63 67 67

Centre de la femme

- 61 av Leclerc - Perpignan 04 68 51 62 97

Pôle d'Imagerie du Sportif :

- Médipole 04 68 50 21 21

Vous allez avoir une visco-supplémentation.

Madame, Monsieur,

Vous souffrez de raideur et de douleurs articulaires chroniques.

Cause :

L'arthrose est une pathologie dégénérative chronique pouvant toucher une ou plusieurs articulations.

Le liquide synovial dans lequel baigne le cartilage articulaire, assure sa protection en amortissant les chocs infligés à l'articulation. L'acide hyaluronique en est le constituant essentiel. Avec l'âge, le liquide synovial perd ses propriétés visqueuse et élastique, entraînant une usure du cartilage se traduisant par des douleurs et une gêne ressentie dans la réalisation des mouvements simples de la vie quotidienne.

VISCO-SUPPLÉMENTATION SOUS RADIOSCOPIE :

Le traitement par visco-supplémentation consiste en l'injection d'une solution d'acide hyaluronique, directement dans l'articulation, restaurant ainsi les propriétés du liquide synovial en créant un véritable « coussinet » intra-articulaire et assurer une bonne lubrification.

Déroulement de l'intervention :

L'intervention se déroule en salle de radiologie dans des conditions d'asepsie rigoureuse.

La réalisation sous contrôle échographique ou radiologique, permet de vérifier la position optimale de l'aiguille et l'injection d'acide hyaluronique en intra-articulaire.

Dans certains cas, une injection concomitante de corticoïde peut être effectuée.

Un pansement sera mis en place au niveau du point de ponction.

Cette intervention se déroule en ambulatoire et dure environ 20 minutes, il n'est pas nécessaire d'être à jeun avec le geste.

Une mise au repos de l'articulation est recommandée durant 24 heures après le retour au domicile.

L'objectif étant une diminution de la douleur et de la gêne fonctionnelle dans les activités de la vie quotidienne.

Les effets apparaîtront en quelques semaines après l'injection et peuvent se prolonger jusqu'à un ou deux ans.

Quels sont les risques ?

Ils sont rares, le plus fréquent étant la douleur au niveau du point d'injection, un traitement antalgique pourra être prescrit.

Le risque d'infection est très rare du fait de l'asepsie rigoureuse au cours du geste.

Afin de réaliser l'acte dans des conditions optimales de sécurité, n'oubliez pas de nous signaler toute prise de médicaments, certains seront susceptibles d'être arrêtés avant l'intervention.

Répondez attentivement aux questions suivantes :

	OUI	NON
Etes-vous allergique à certains médicaments, aliments, latex ou autres substances allergènes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Avez-vous fait une réaction particulière lors d'un examen radiologique Avec injection de produit de contraste ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Prenez-vous un traitement fluidifiant du sang tel que Plavix, Kardégic, Aspégic ou Previscan ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Etes-vous enceinte ou susceptible de l'être ? Allaitez-vous ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ATTESTATION

Je soussigné(e), Madame, Mademoiselle, Monsieur,.....

Certifie avoir pris connaissance de la fiche d'information concernant le ou les examens désignés.....

Qui sera réalisé par le Docteur.....

En date du.....

Et reçu les réponses satisfaisantes à mes questions concernant cet examen.

Signature du patient.